



Verein für von der von Hippel – Lindau (VHL) Erkrankung betroffene Familien e.V.

Sonstige seltene Veränderungen

Inhalt:

1. VON HIPPEL-LINDAU ERKRANKUNG - Leitfaden für Patienten und Ärzte - Hrsg. Verein für von der Hippel - Lindau (VHL) Erkrankung betroffene Familien e.V., Nov. 2002
Autor: Prof. Dr. H. Neumann, Medizinische Universitätsklinik Freiburg
Beitrag: Sonstige seltene Veränderungen

VON HIPPEL-LINDAU ERKRANKUNG - Leitfaden für Patienten und Ärzte -
Hrsg. Verein für von der Hippel - Lindau (VHL) Erkrankung betroffene Familien
e.V., Nov. 2002

Autor: Prof. Dr. H. Neumann, Medizinische Universitätsklinik Freiburg

Beitrag: Sonstige seltene Veränderungen

Bei Patienten mit der Von Hippel-Lindau Erkrankung können selten auch Veränderungen in Organen vorkommen. Hierbei handelt es sich meistens um Zysten oder Angiome in Leber, Milz, Lunge, Haut oder Knochen. Diese Veränderungen sind wegen ihrer Seltenheit nicht das Ziel von Vorsorgeuntersuchungen, können aber gelegentlich als Zufallsbefund entdeckt werden. Fachliteratur sollte zu Rate gezogen werden, um solche Befunde der Von Hippel-Lindau Erkrankung zuordnen zu können.